

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R-40/2007 z dnia 27.08.2007.
zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 725/2000 z dnia 12.05.2000r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Rokita-Agro S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,
tel: (0-prefiks-71) 794-22-35, fax. (0-prefiks-71) 794-21-50, www.rokita-agro.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

P r o R o k 450 EC


Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji aktywnej:

prochloraz /N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]imidazol-1-ilocarboksyamid (związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka.

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: ksylen- mieszanina izomerów.

Zezwolenie MRiRW Nr 725/2000 z dnia 12.05.2000r. zmienione decyzją MRiRW z dnia 06.02.2001r., decyzją MRiRW Nr 3/2002 z dnia 04.02.2002r., decyzją MRiRW Nr R - 519/2003p z dnia 22.09.2003r., decyzją MRiRW Nr R -139/2004o z dnia 25.03.2004 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-40/2007 z dnia 27.08.2007 r.



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Produkt łatwopalny.

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

Zboża ozime.

pszenica, pszenżyto, jęczmień, żyto.

-lamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

Zboża ozime i jare

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare.

-septorioza liści, septorioza plew, mączniak prawdziwy.

jęczmień ozimy, jęczmień jary.

-rynychosporioza, plamistość siatkowa, mączniak prawdziwy.

żyto.

-rynychosporioza, mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:

- **pszenica, pszenżyto, żyto:** od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
 - **jęczmień:** od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

rzepak ozimy, rzepak jary.

-czern krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

Zalecana dawka: 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.

W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyń na rzepaku.

UWAGI:

1. Środek stosować w zbożach jednorazowo w okresie wegetacji:

- do zwalczania łamliwości źdźbła zbóż ozimych i wczesnie występującego mączniaka prawdziwego

lub

- do zwalczania kompleksu chorób zbóż jarych i ozimych - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): zboża - 35 dni,
rzepak - 45 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Natychmiast zdjąć całą

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -